

**Stimulátor zakořeňování**  
pomocný rostlinný přípravek

**Žadatel:** AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 747 71 Brumovice, IČ: 25853970

**Výrobce:** TRISOL farm, s.r.o., Dolní 142/6, 747 23 Bolatice, IČ: 25835921

**Číslo rozhodnutí o registraci: 4993**

**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

vlastnost:	hodnota:
Sušina v % min.	3,0
Spalitelné látky v sušině v % min.	50,0
Huminové látky v % min.	2,0
Hodnota pH	8,0 - 10,0

Dále obsahuje stimulační a protistresové látky TRISOL a smáčivé látky (1%).

**Obsah rizikových prvků** splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0; arsen 20, chrom 50.

**Rozsah a způsob použití**

Podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení. Obsahuje huminové látky vyrobené z leonarditu pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin. Dále obsahuje extrakt z mořské řasy *Ascophyllum nodosum* pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovým faktorům, syntetické auxiny pro stimulaci kořenového systému, chelatační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše.

Používá se k namáčení semen, hlíz, kořenů a řízků rostlin před výsadbou, k aplikaci především na mladé rostliny během vegetace, k regeneraci trvalých porostů po zimě a pro odstranění stresu rostlin po použití chemických přípravků (především herbicidů) nebo po poškození mrazem nebo kroupami apod.

Přípravek je možné použít samostatně nebo také v kombinaci s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. Nedoporučujeme použití přípravku současně s herbicidy. **Upozornění – nepřekračujte doporučené dávkování.**

ZPŮSOBY POUŽITÍ

**1. Namáčení semen, hlíz, kořenů a řízků rostlin**

Použijte v dávce 50 ml přípravku na 1 l vody, doba máčení cca 10 minut.

Zbytek aplikační kapaliny můžete doředit a aplikovat postřikem (1:3) nebo zálivkou (1:15).

**2. Aplikace postřikem (na mladé rostliny nebo při regeneraci rostlin po zimě)**

Použijte v dávce 25 ml přípravku na 1 l vody, max. 2x za vegetační období (réva – max. 3x, travníky – max. 5x).

**3. Aplikace zálivkou**

Použijte v dávce 50 ml přípravku na 10 l vody na plochu 100 m<sup>2</sup>, max. 2x za vegetační období.

**Pro odstranění stresu rostlin** - po použití chemických přípravků (především herbicidů) nebo po poškození mrazem nebo kroupami, apod. – aplikujte dle bodů 2) nebo 3).

**Při použití herbicidů** použijte přípravek až po účinku herbicidu na plevely, tj. až min. sedmý den po aplikaci herbicidu.

#### PLODINY

Doporučený odstup mezi jednotlivými aplikacemi je min. 10 - 14 dnů.

**Brambory** - pro máčení hlíz, od vzejití po zapojení řádků (cca do 10. června), počet aplikací 1 - 2. Po zapojení řádků již přípravek neaplikujte.

**Zelenina** - od počátku vegetace 2 aplikace, při poškození rostlin.

**Česnek** - máčení stroužků, po vzejití (regenerace po zimě), dále během vegetace 1 - 2 aplikace.

**Cibule** - po vzejití 1 - 2 aplikace, po použití chemických přípravků.

**Jahody** - při výsadbě máčením kořenů, během vegetace 1 aplikace, po sklizni 1 aplikace společně s podzimním přihnojením pro lepší násadu květů na příští rok.

**Ovocné dřeviny** - při výsadbě, po výsadbě 1 - 2 aplikace, jarní regenerace.

**Réva vinná** - při výsadbě, před květem a po odkvětu, na plody velikosti hrášku.

**Travníky** - po vysetí 2x, pro jarní regeneraci, během vegetace 1 - 5x.

**Okrasné rostliny a okrasné dřeviny** - před výsadbou prostokořených rostlin, při výsadbě z kontejnerů, po výsadbě 1 - 2x, pro regeneraci.

#### **Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

#### **Podmínky skladování:**

Skladujte v původních obalech v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům při teplotách 5-29°C. Případné zbytky hnojiva v ředění 1:2000 použijte k záливce. Likvidace obalů - vyprázdněné obaly vypláchněte a odevzdejte do organizovaného sběru. Obaly nespalujte.

**Přípravek se dodává balený. Objem balení:**

**Doba použitelnosti:** 5 let od data výroby při skladování v původních obalech

**Datum výroby a číslo výrobní šarže:** uvedeny na obalu