

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 63390/2014/SOZ.

Dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentráту zahuštěné emulze pro ředění vodou k hubení klíšťat a komárů při plošných aplikacích ve venkovních prostorách.

OBSAHUJE:

Insekticidní přípravek ve formě koncentráту zahuštěné emulze pro ředění vodou k postřiku, s názvem **ATAK Sada proti klíšťatům a komárům** (biocidní insekticid - sk. 18), obsahující biologicky účinnou látku: 200 g **permethrin** m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát v 1 litru přípravku.

POZOR!

Přípravek obsahuje nebezpečnou látku m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát.

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi!

Adjuvant (pomocný přípravek neobsahující pesticidy) s názvem **Grassfil** obsahující min. 85 % polyterpenové pryskyřice. Přípravek používejte jen podle návodu!

Směs složek účinkuje kontaktně a požerově na klíšťata a komáry, a současně vykazuje silný repelentní účinek - také na užitečný hmyz.

Přísada adjuvantu zamezuje rychlému splachování insekticidního přípravku z ošetřených ploch, což zajišťuje prodloužený účinek přípravku.

URČENÍ:

Insekticidní přípravek hubí a odpuzuje **klíšťata a komáry při plošných aplikacích (pod stromy a keři zastíněných trávníky, nebo na jiných plochách)** v zahrádkářských koloniích, chatových osadách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích, apod. Adjuvant vytváří pod vlivem slunečního světla polymerový film umožňující, aby se biologicky aktivní látka (obsažená v insekticidním přípravku) udržovala na ošetřených plochách po delší dobu.

POZOR: Insekticidní přípravek je toxický pro včely! Nepoužívat v blízkosti včelínů. Zárok provádět v pozdních večerních hodinách nebo brzy ráno. Při zásahu proti klíšťatům a komárům neošetřovat rostliny, které jsou určeny pro konzumaci nebo jako krmivo. Vstup na ošetřené venkovní plochy je možný až po zaschnutí postřiku.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem Insekticidním přípravkem nesmějí být postřikovány žádné potraviny, nádobí na potraviny nebo krmiva.

DOPORUČENÁ KONCENTRACE, DÁVKOVÁNÍ:

Hubení klíšťat a komárů ve venkovním prostředí:

metoda postřiku: zhotovit 1 % pracovní roztok pro insekticid i adjuvant (tj. směs, 10 ml insekticidního přípravku ATAK Sada proti klíšťatům a komárům + 10 ml adjuvantu Grassfil, na 1 l vody).

Používat v dávce 1 l pracovního roztoku na 20 m² plochy.

PŘÍPRAVA UŽITKOVÉ KAPALINY:

Určete potřebná množství přípravku a adjuvantu. Obsah láhví dobře protřepejte. Odměřte určená množství přípravku a adjuvantu a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte. Vyprázdněné obaly třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače. Doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze. Ihned proveďte zákrok.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZÁKROKU:

Zárok může být proveden pomocí většiny typu postřikovačů používaných pro hubení hmyzu.

Používat hrubší postřik – pro lepší pokryvnost insekticidu. Vyhýbat se provádění zároku v deštivých dnech a těsně před očekávanými dešťovými srážkami, které mohou způsobit spláchnutí postřikem nanesené vrstvy přípravku z postříkaných povrchů. Trvanlivost nanesené vrstvy přípravku závisí hlavně na intenzitě slunečního záření.

Při aplikačním postřiku se plocha prochází ideálně dvakrát, a to ve směrech na sebe kolmých. Vzhledem k vývoji škůdců (klíšťat) se doporučuje termín postřiku ideálně **v dubnu (2. polovina dubna), kdy je hlavní výskyt 1. generace klíšťat**, až do konce června. Další postřik se doporučuje **v polovině září** (druhá generace klíšťat).

DOBA PŮSOBNÍ:

Přípravek působí po dobu nejméně několika dnů, a to podle kvality provedení zároku, druhu postřikovaného povrchu, intenzity slunečního záření, prašnosti apod. Na plochách, na kterých bylo aplikováno vápno, rychle podléhá deaktivaci.

SKLADOVÁNÍ:

Zabraňte promrznutí přípravku.

UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

PRVNÍ POMOC:

Při nadýchání:

Osobu postiženou kontaminací odstranit z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch.

Při požití: V případě podezření otravy ihned přivolat lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ! Osobě v bezvědomí se nesmí podávat nic vnitřně a nesmí se vyvolávat zvracení!

Při styku s kůží: V případě polítní sundat znečištěný oděv a potřísněnou kůži umýt dobře vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako: svědění, pálení nebo tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, je nutno přivolat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: V případě kontaminace očí je ihned promývat proudem vody po dobu několika minut. Přivolat lékařskou pomoc.

LÉKÁŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: **+420224919293** nebo **+420224915402**

Upozornění

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je **doba použitelnosti přípravku 3 roky od data výroby.**

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!