

Obchodní název pomocného prostředku: Slimakill

Formulační úprava: inertní nosič

Typ působení pomocného prostředku: bioagens – parazitické hlístice

Kategorie uživatelů: Neprofesionální uživatel

Název účinné složky: Pellioditis hermaphrodita

Množství pomocného prostředku v obalu: 12 000 000 jedinců

Držitel povolení: INEF BioP s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice, Česká republika

Osoba odpovědná za konečné označení pomocného prostředku: INEF BioP s.r.o.,

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice, Česká republika, www.inefbiop.cz,

tel.: +420 728 253 384

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1869-OB

Číslo šarže/datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 6 týdnů od data výroby, skladování v rozmezí teplot +4 až +15 °C

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Způsob působení: Hlístice Pellioditis hermaphrodita je parazit, který aktivně uyhledává a napadá slimáčky a plzáky, do nichž proniká tělními otvory. Následně uvolní symbiotickou bakterii, která hostitelský organismus zabije a hlístice se bakteriemi posléze živí. Napadení jedinci hynou během jednoho týdne až 10 dnů po infekci. Ihned po infekci přestávají přijímat potravu. V mrtvém těle se uyužijí další hlístice, které poskytují dlouhodobou ochranu. Slimáčci a plzáci se aktivně uhybají ošetřeným plochám. Hlístice hubí slimáčky všech vývojových stádií a mladé jedince plzáků. Aplikace proti plzákům je vhodná v době výskytu mladých jedinců na jaře a na podzim. Pro ulitnaté plže je přípravek bezpečný.

1) PLODINA, OBLAST POUŽITÍ	2) ŠKODLIVÝ ORGANISMUS, JINÝ ÚČEL POUŽITÍ	DÁVKOVÁNÍ, MÍSITELNOST	OL	POZNÁMKA 1) K PLODINĚ 2) K ŠO 3) K OL	4) K DÁVKOVÁNÍ 5) UMÍSTĚNÍ 6) URČENÍ SKLIZNĚ
Okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	Plzáci, slimáčci	12 mil. jedinců/ 40 m ²	-	2) kurativně	5) venkovní prostory, chráněné prostory
Okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	Plzáci, slimáčci	12 mil. jedinců/ 60-80 m ²	-	2) preventivně	5) venkovní prostory, chráněné prostory
Okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	Plzáci, slimáčci	30 mil. jedinců/ 100 m ²	-	2) kurativně	5) venkovní prostory, chráněné prostory
Okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	Plzáci, slimáčci	30 mil. jedinců/ 150-200 m ²	-	2) preventivně	5) venkovní prostory, chráněné prostory

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

OL (dny) – ochranná lhůta je odstupem mezi aplikací a sklizní

*Dávka je stanovena pro celoplošné použití; pokud se ošetřuje nezapojený porost se širokým meziřadím, je třeba přizpůsobit dávkování skutečně ošetřované ploše.

PLODINA, OBLAST POUŽITÍ	ZPŮSOB APLIKACE	MAXIMÁLNÍ POČET APLIKACÍ V PLODINĚ	INTERVAL MEZI APLIKACEMI
Okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	rozhoz	Bez omezení	28 dnů

Upřesnění použití: Aplikujte na mírně vlhkou půdu, nejlépe ve večerních hodinách nebo podmračeném počasí. Zapravte do půdy 1 až 5 cm hluboko a zalijte přiměřeným množstvím vody. Teplota při aplikaci by neměla klesnout pod +5 °C ani překročit +25 °C. Po aplikaci udržujte půdu mírně vlhkou alespoň dva týdny. Neaplikujte za vysokých teplot, přímého slunečního záření a do suché půdy, neboť může dojít k úhynu hlístic a snížení účinnosti.

Další omezení: Kompatibilitu přípravku s chemickými postřiky je vhodné ověřit u dodavatele či výrobce. Bioagens nikdy neaplikujte, pokud jste na pozemek (do půdy) aplikovali látku se známým nematocidním účinkem (např. dusíkaté vápno), a to po dobu působení této látky. Po dobu 8 týdnů po aplikaci bioagens na pozemek neaplikujte na stejný pozemek látky s nematocidním účinkem (např. dusíkaté vápno).

Osobní ochranné pracovní prostředky: Ochrana dýchacích orgánů, ochrana očí a obličeje, dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Ochrana těla: celkový pracovní ochranný oděv z textilního materiálu. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv s ohledem na práci v příslušném terénu.

Informace o první pomoci: Všeobecné pokyny: pokud se projeví zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Zasažení kůže: zasažené části pokožky důkladně umyjte vodou a mýdlem. Náhodné požití: podejte 0,5 l pitné vody, nevyvolávejte zvracení, kontaktujte lékaře. Nadýchání při aplikaci: nepředpokládá se. Zasažení očí: nepředpokládá se.

Při uyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým jste pracovali, poskytněte mu informace ze štítku, etikety či příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i eventuální následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Informace ke skladování pomocného prostředku: Doba použitelnosti: 6 týdnů od data výroby. Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě v rozmezí +4 až +15 °C. Skladujte v temnu samostatně a odděleně od ostatních pomocných prostředků. Skladujte mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte společně s chemickými přípravky na ochranu rostlin. Nikdy neustavujte mrazu ani přímému slunečnímu světlu. Neskladujte již otevřená balení.

Likvidace obalů a zbytků: Použité obaly a zbytky lze likvidovat jako komunální odpad. Odezdejte obaly k recyklaci. Prázdné obaly nepoužívejte k žádným jiným účelům.

Upozornění: Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny. Riziko poškození plynoucí z ulivů, které leží mimo kontrolu výrobce a distributora je rizikem spotřebitele. Škody, které vzniknou špatným skladováním nebo použitím přípravku v rozporu s etiketou a návodem na použití jdou k tíži spotřebitele. ováním nebo použitím přípravku v rozporu s etiketou a návodem na použití jdou k tíži spotřebitele.